1

2

KYSTE COLLOÏDE OBSTRUCTIF DU 3e VENTRICULE

Alexis Vincec*, Matthieu Jourdain, Remy Tholliez**, Nicolas Houdre**, Cédric Gozé****

* Service de radiologie et radiologie interventionnelle,
** Service des urgences et SMUR,
CH Valenciennes,
59322 Valenciennes
mat_jourdain@hotmail.com

Cet homme de 27 ans avait depuis quelques semaines des céphalées rémittentes en casque, de durée variable, accompagnées de nausées et peu sensibles aux antalgiques simples. La conscience était normale, l'examen clinique sans particularités et le bilan biologique normal. Une tomodensitométrie sans injection et une imagerie par résonance magnétique cérébrales montraient une hydrocéphalie aiguë obstructive biventriculaire et une tumeur du 3e ventricule de 2 cm de diamètre située en regard des foramens interventriculaires de Monro et correspondant à un kyste colloïde (fig. 1 et 2). Le patient était alors orienté en urgence en neurochirurgie afin de poursuivre la prise en charge.

Les kystes colloïdes, tumeurs bénignes de la ligne médiane de 5 à 40 mm de diamètre, localisés sur la partie antérosupérieure du 3e ventricule représentent 0,5 % des tumeurs du système nerveux central et touchent des patients entre 30 et 50 ans.[1] La symptomatologie est aspécifique. Une mort subite peut survenir[2] indépendamment de la taille de la tumeur sans que les mécanismes soient actuellement clairement expliqués.[3] Des cas de rupture avec hémorragies cérébrales ont été décrits.

1. **Sundaram C, Paul TR, Baju BV, et al.** Cysts of the central nervous system: a clinicopathologic study of 145 cases. Neurol India 2001;49:237-42.
2. **Shaktawat SS, Salman WD, Zuhair Twaij, et al.** Unexpected death after headache due to a colloid cyst of the third ventricle. World J Surg Oncol 2006;4:47.
3. **Hamlat A, Pasqualini E, Askar B.** Hypothesis about the physiopathology of acute deterioration and sudden death caused by colloid cysts of the third ventricle. Med Hypotheses 2004;63:1014-7.

TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN